

**Nome comune:** TACCOLA (Inglese: jackdaw)

**Nome scientifico:** Corvus monedula

**Famiglia:** Corvidi (*Corvidae*)

**Ordine:** Passeriformi (*Passeriformes*)

**Classe:** Uccelli (*Aves*)



animalieanimali

**A cura di Stefania Busatta**

### **CARATTERISTICHE:**

Il piumaggio della taccola è completamente nero. Si notano delle sfumature più chiare sulla nuca. Le zampe, relativamente corte, sono scure e l'occhio è chiaro.

In volo può essere riconosciuta per i caratteristici veloci battiti d'ala.

Il Corvus monedula, è il più piccolo Corvide e misura 33-34 cm, pesa 180-260 g e ha un'apertura alare di 67-74 cm.

### **VITA ED ABITUDINI:**

E' una specie che tollera un'ampia varietà di ambienti e di climi, anche se evita le condizioni estreme (caldo, freddo, neve e ghiaccio). Ha colonizzato boschi, parchi, giardini, coltivi, scogliere marine e città.

Si nutre di invertebrati, frutti, semi, resti animali e, talvolta, di resti animali che trova nei parchi, nelle aree agricole e in prossimità delle abitazioni. Di solito la taccola si alimenta in coppia o in piccoli stormi.

E' una specie molto socievole e rumorosa, e spesso si confonde tra altri Corvidi. Così come per altri simili, la coppia è l'unità del gruppo e il legame si protrae per molto tempo (anche per anni) e, nel corso dell'anno, la coppia visita di tanto in tanto l'area di nidificazione.

In primavera si realizza l'unica covata di 4-6 uova, incubate poi per una ventina di giorni. Il nido è costruito in luoghi inaccessibili come la cavità di un albero, di una roccia oppure in qualche artefatto (come ciminiere e ponti). L'involo avviene dopo circa 28-36 giorni.

### **DOVE E' POSSIBILE INCONTRARE LA TACCOLA:**

E' presente nell'Europa occidentale (ad eccezione dell'estremo nord) sino alla Russia centrale.

### **CURIOSITA':**

In primavera la taccola avvia la ricerca di materiale utile per il nido. In particolare è stata avvistata a strappare la lana alle pecore, così da creare un morbido nido per i nidiacci.