

Nome comune: CAPINERA (Inglese: blackcap)

Nome scientifico: Sylvia atricapilla

Famiglia: Silvidi (Sylviidae)

Ordine: Passeriformi (Passeriformes)

Classe: Uccelli (Aves)



Foto Andrea Vellani: <http://www.andreavellani.it>

animalieanimali 

A cura di Stefania Busatta

CARATTERISTICHE:

Questo Passeriforme presenta un piumaggio giallo e grigio e nero sul capo. In particolar modo il maschio possiede una sorta di cappuccio nero lucido che si prolunga sino sotto all'occhio; le guance e le parti inferiori sono grigio chiaro. Diversamente la femmina possiede un piumaggio con tonalità più brune e il cappuccio è grigio-rossastro. Le zampe di quest'uccellino sono grigio scure ed il becco è nerastro con la base più chiara. Come in molti uccelli, i giovani presentano un abito simile a quello della femmina.

Il maschio si esibisce in canti a piene note, ed è anche un ottimo imitatore.

Le dimensioni della capinera sono circa 15 cm di lunghezza con un'apertura alare di 20-23 cm.

VITA ED ABITUDINI:

Al di là del periodo riproduttivo, durante il quale è solitaria e territoriale, la capinera la possiamo osservare anche in piccoli stormi.

Predilige gli ambienti arborei ricchi di sottobosco, le siepi, gli alberi sparsi, i frutteti, i giardini, i cespugli.

Possiede un canto molto dolce e musicale ed il maschio canta rimanendo nascosto tra gli alberi, e quindi è difficilmente osservabile.

Questa specie è principalmente monogama, anche se eccezionalmente sono stati osservati un maschio con due femmine.

Prima che giunga la femmina nell'area riproduttiva, il maschio ha già costruito diversi "nidi di prova" d'erba secca o radici ognuno dei quali è sistemato tra i ramoscelli (posti sino a 3 m di altezza). Al suo arrivo la femmina valuta l'operato e decide se terminare uno dei nidi o di costruirne uno nuovo.

Entrambi gli adulti covano le 4-6 uova, che possono variare notevolmente nel colore e nella punteggiatura. Generalmente la cova dura un paio di settimane e di solito si verifica una sola covata all'anno. Anche la cura dei pulcini richiede impegno di entrambi i genitori, e si protrae per 1-2 settimane.

DOVE E' POSSIBILE INCONTRARE LA CAPINERA:

E' una specie eclettica che può vivere in habitat estremamente diversi tra loro. La possiamo incontrare nei boschi di latifoglie e di conifere, tra le siepi rigogliose o nella macchia con alberi alti. L'areale di nidificazione della capinera si estende dalla Penisola Iberica sino alla Siberia centrale. A nord la capinera si spinge sino alla Norvegia. In Italia è presente uniformemente su tutta la penisola dal livello del mare sino ai 1800 m di altitudine.

CURIOSITA':

L'impegno del maschio nel periodo riproduttivo è notevole. Può costruire diversi nidi, nella speranza che almeno uno sia gradito alla femmina. Talvolta è fortunato e la futura compagna si limita ad adornare il nido preferito, altre volte non apprezza il lavoro fatto e così, con l'aiuto dello stesso maschio, ne costruisce un altro.