

**Nome comune: CASUARIO AUSTRALIANO
e CASUARIO DI BENNETT (Inglese: cassowary)**

**Nome scientifico: Casuarius casuarius (casuario australiano)
e Casuarius bennetti (casuario di Bennett)**

Famiglia: Casuari (*Casuariidae*)

Ordine: Casuariformi (*Casuariiformes*)

Classe: Uccelli (*Aves*)



A cura di Stefania Busatta

animali e animali

CARATTERISTICHE

Questi uccelli, così come gli struzzi, gli emù e i nandù, non sono in grado di volare, ma possiedono delle zampe molto potenti. Il piumaggio è completamente nero. La pelle della testa e del collo è blu e rossa.

Sulla testa è presente una cresta particolarmente accentuata, utile per muoversi nella densa vegetazione.

Non si osserva alcun dimorfismo sessuale, il maschio e la femmina sono quindi molto simili.

Il Casuario Australiano è più alto di quello di Bennett, raggiungendo i 160 cm contro i 110 cm.

VITA ED ABITUDINI

Questo uccello, inetto al volo, ha sviluppato una spiccata capacità nella corsa.

Conduce una vita solitaria per la maggior parte dell'anno, ad eccezione del periodo riproduttivo.

In questa fase il maschio corteggia la femmina mettendo in evidenza il vaporoso piumaggio ed emettendo dei particolari richiami sonori. Solitamente la femmina visita i territori di maschi diversi accoppiandosi di volta in volta e lasciando ad ognuno di essi l'onere della cova e della cura dei pulli.

La vita solitaria viene meno nella stagione riproduttiva. Il nido è realizzato a terra e sono deposte dalle 4 alle 8 uova verdastre (così da confondersi con il suolo).

Il casuario si nutre di insetti, di frutti e di piccoli vertebrati che scova nelle forestali esplorate. La cresta cornea posta sul capo serve proprio a rimuovere le foglie e scovare il cibo.

DOVE E' POSSIBILE INCONTRARE IL CASUARIO

Questo uccello un tempo era molto più comune, ma la pressione venatoria ne ha ridotto drasticamente la consistenza. Il casuario australiano si trova nella Nuova Guinea e in Australia settentrionale; il casuario di Bennett vive nella Nuova Guinea e nella Nuova Britannia.

CURIOSITA'

La femmina del Casuario di Bennett prima della nidificazione si dimostra particolarmente aggressiva, attaccando chiunque la disturbi con le sue pericolose unghie lunghe ben 10 cm.