

Nome comune: CODONE (Inglese: pintail)

Nome scientifico: Anas acuta

Famiglia: Anatidi (*Anatidae*)

Ordine: Anseriformi (*Anseriformes*)

Classe: Uccelli (*Aves*)



Foto Andrea Vellani: <http://www.andreavellani.it>

animalieanimali

A cura di Stefania Busatta

CARATTERISTICHE:

Questo Anatide sfoggia un bel piumaggio dai riflessi metallici. Il maschio, in particolare, possiede la testa marrone con la nuca rossastra; il lungo collo anteriormente è bianco così come il petto ed il ventre; il candore sfuma, in prossimità del sottocoda, in un color crema; la parte inferiore della lunga coda è nera; anche il dorso è pennellato di nero e di grigio. Particolarità del maschio sono le lunghe penne della coda (timoniere centrali) tenute drizzate fuori dall'acqua mentre nuota. La femmina possiede una livrea con colori meno contrastanti: il capo è marrone ed il corpo è pennellato di bianco, marrone e nero; così come nel maschio, la porzione ventrale è più chiara di quella dorsale. Il codone è lungo 50-60 cm e pesa tra i 500 e i 1000 g (il maschio è più grande della femmina).

VITA ED ABITUDINI:

Ama le pozze d'acqua (paludi aperte, estuari e lagune costiere per svernare) con una buona copertura vegetazionale, meglio se in prossimità di aree coltivate; nel periodo invernale cerca riparo negli estuari e nelle acque interne.

Per la maggior parte dell'anno è una specie gregaria. Solitamente si creano piccoli gruppi nelle zone interne, ma stormi estremamente numerosi nelle acque aperte. Queste associazioni si formano subito dopo il periodo riproduttivo, quando la coppia viene meno e i maschi per primi s'aggregano. Nella tarda estate ed in autunno i gruppi sono sessualmente segregati (associazioni di maschi distinte da quelle delle femmine), per fondersi durante l'inverno.

In aprile il codone depone le uova (7-9) in un nido spesso allestito con rami e erba sotto la boscaglia, e, talvolta, in aree aperte in prossimità dell'acqua (ma anche a 1-2 km di distanza dall'ambiente acquatico). Solitamente i nidi non sono realizzati in colonie anche se possono essere molto vicini. Le uova sono incubate per una ventina di giorni e i giovani sono indipendenti dopo circa un mese e mezzo.

E' una specie principalmente migratoria, che abbandona nella stagione invernale i paesi freddi e cerca protezione in quelli caldi.

Il codone si nutre di una gran varietà di piccoli animali e piante, che trova a 10-30 cm di profondità oppure a terra; spesso nuota esclusivamente con la testa ed il collo sott'acqua e, talvolta, si immerge completamente.

DOVE E' POSSIBILE INCONTRARE IL CODONE:

E' presente in Europa, in Asia e in America settentrionale. Sverna a sud sino a Panama, Africa centrale, India e Filippine.

CURIOSITA':

Il codone per mangiare s'immerge in posizione verticale setacciando i fondali laddove altri Anatidi non riescono a giungere.