

Nome comune: FRINGUELLO (Inglese: chaffinch)

Nome scientifico: Fringilla coelebs

Famiglia: Fringillidi (*Fringillidae*)

Ordine: Passeriformi (*Passeriformes*)

Classe: Uccelli (*Aves*)



A cura di Stefania Busatta

CARATTERISTICHE:

Questo piccolo uccello possiede il becco conico, la coda piuttosto lunga e la testa appuntita. Il maschio e la femmina sono facilmente distinguibili. Il primo è vivacemente colorato, mentre la seconda presenta colori piuttosto pallidi. Il maschio presenta il petto rossastro; il capo grigio sfuma verso il marrone; la coda è verde brillante e l'estremità grigio scuro; le ali sono a bande bianco e nero.

E' lungo circa 15 cm ed ha un'apertura alare di 24-28 cm.

VITA ED ABITUDINI:

Il fringuello è molto comune anche nei pressi delle abitazioni. Ama i boschi misti, i giardini e le aree aperte con alberi sparsi. In inverno si formano dei grandi stormi che si nutrono di semi, visitano i giardini e i campi. E' quindi un uccello gregario, al di fuori del periodo riproduttivo.

Il fringuello è particolarmente attivo nelle prime ore del mattino nella ricerca di cibo, che comprende semi, vegetali vari e, soprattutto nel periodo riproduttivo, piccoli animali invertebrati. Solitamente i semi sono raccolti a terra e non direttamente dalle piante ed in primavera lo si può ammirare mentre cerca di catturare gli insetti fra le fronde degli alberi.

La maggior parte di questi uccelli non migra durante l'inverno, anche se alcune popolazioni preferiscono lasciare le regioni più fredde per quelle più confortevoli.

La primavera corrisponde al periodo riproduttivo, durante il quale il fringuello diventa altamente territoriale ed il canto del maschio serve proprio a delimitare l'area occupata. Il maschio e la femmina sono fedeli in questo periodo (specie monogama).

Il nido, costruito su un albero o su un cespuglio, è ricoperto esternamente con muschio e licheni, così da essere difficilmente scovato. Sono deposte 4-5 uova che sono incubate per un paio di settimane. Dopo la schiusa, i giovani lasciano il nido in circa 15-18 giorni.

DOVE E' POSSIBILE INCONTRARE IL FRINGUELLO:

E' presente dall'Europa occidentale alla Siberia, in Medio Oriente, in Africa settentrionale e nelle isole atlantiche.

CURIOSITA':

Il maschio per conquistare la femmina, oltre a cinguettare, effettua un volo particolare, ponendosi ad un'altezza inferiore rispetto alla partner, esponendo un lato del corpo ed avvicinandole l'ala così da porre in evidenza il piumaggio rosso.