

**Nome comune: MARABU' AFRICANO (Inglese: marabou)**

**Nome scientifico: Leptoptilos crumeniferus**

**Famiglia: Ciconidi (*Ciconiidae*)**

**Ordine: Ciconiformi (*Ciconiiformes*)**

**Classe: Uccelli (*Aves*)**



animalieanimali

**A cura di Stefania Busatta**

### **CARATTERISTICHE:**

Ciò che più colpisce di questo grande Ciconiforme è la presenza, nel maschio adulto, di una grande tasca gulare che pende davanti al collo. Il becco è massiccio e lungo.

Le lunghe zampe sono bianche. La testa ed il collo sono prive di penne così come la tasca gulare. Il piumaggio sulla porzione inferiore del corpo è chiaro, mentre la porzione superiore e le ali sono scure con delle chiare pennellate sparse.

Il L. crumeniferus è lungo 115-130 cm ed ha un'apertura alare di 225-255 cm.

### **VITA ED ABITUDINI:**

Predilige le grandi zone umide (come le rive dei fiumi e dei laghi) ed aperte.

I marabù sono degli spazzini e si nutrono di animali morti o parti di essi, ad esempio dei resti lasciati dai leoni. Inoltre parassitano le colonie di fenicotteri, cibandosi delle uova e dei pulcini e non disdegnano qualsiasi altro animale dalle dimensioni accessibili, come le rane.

Quando cammina, il marabù tiene il corpo eretto con la testa tra le spalle e facilmente si posa sugli alberi. Il battito delle ali è lento e ricorda quello degli avvoltoi.

La sacca gulare può essere gonfiata e sgonfiata durante il corteggiamento della femmina. La stagione degli amori avviene nel periodo secco.

### **DOVE E' POSSIBILE INCONTRARE IL MARABU':**

E' distribuito nell'Africa tropicale e subtropicale.

### **CURIOSITA':**

Un tempo si riteneva che la tasca gulare fosse utilizzata per immagazzinare il cibo; in realtà, grazie ad un sistema di sacchi aerei connessi con le narici, la sacca può essere gonfiata e sgonfiata così da attirare l'attenzione della partner.