

**Nome comune: ROSPO COMUNE (Inglese: common toad)**

**Nome scientifico: Bufo bufo**

**Famiglia: Bufonidi (Bufonidae)**

**Ordine: Anuri (Anura)**

**Classe: Anfibi (Amphibia)**



**A cura di Stefania Busatta**

**animalieanimali** 

### **CARATTERISTICHE:**

Il corpo del rospo è tozzo, il muso arrotondato e la pupilla è orizzontale. La pelle ha l'aspetto verrucoso.

Lateralmente sul capo sono evidenti dei rigonfiamenti (ghiandole parotoidi che, tra l'altro, producono sostanze irritanti) divergenti tra loro.

Il dorso presenta una colorazione variabile dal bruno-giallastro al rossastro al grigio-verdastro con macchie scure.

La differenza tra il maschio e la femmina (dimorfismo sessuale) si evidenzia per diversi fattori: il maschio misura circa 10 cm (metà della femmina) ed inoltre possiede arti anteriori più robusti e possenti (con delle callosità nere sul lato interno delle prime tre dita particolarmente evidente nel periodo riproduttivo)

### **VITA ED ABITUDINI:**

Conduce una vita quasi esclusivamente notturna, trascorrendo il giorno e le stagioni più fredde sotto i sassi, tra le pietre, nei vecchi muri, ecc. Generalmente si muove camminando e, nel caso in cui sia allarmato, saltando. Durante il periodo riproduttivo è attivo anche di giorno.

Il rospo comune è particolarmente resistente alla carenza d'acqua e agli ambienti aridi.

Nel periodo riproduttivo il maschio emette dei richiami non facilmente udibili. L'accoppiamento avviene in acqua, anche se può iniziare a terra. Talvolta si protrae per settimane, tanto che può accadere di incontrare la femmina che si sposta sul terreno trasportando il maschio sul dorso. La femmina depone più di 6000 uova completamente nere, con un diametro di 1,5-2 mm disposte su 3-4 file all'interno di un unico cordone gelatinoso lungo sino a 5 m. La deposizione avviene tra febbraio e giugno (principalmente in marzo-aprile) anche in acque salmastre. Se le condizioni climatiche sono buone, la larva sguscia dopo circa un paio di settimane e metamorfosa dopo circa 2-3 mesi. La dieta delle larve (girini) include un po' tutto inclusi i vegetali (dieta fitofaga-onnivora), per divenire negli adulti prettamente carnivora (Insetti, Artropodi, vermi, ecc.).

## **DOVE E' POSSIBILE INCONTRARE IL ROSPO:**

E' diffuso in tutta l'Europa sino all'Asia e al Giappone, nell'Africa nord-occidentale. Non è presente ad eccezione della Scandinavia settentrionale, Irlanda, isole Baleari, Corsica, Sardegna, Creta, Malta e le altre isole minori.

## **CURIOSITA':**

Quando il rospo s'imbatta in un predatore assume una peculiare postura (posizione) con la testa abbassata e la parte posteriore del corpo sollevato.